

6.2.Completeness based on Polynomial-time Reducibility

6.2.1. Definition of Completeness and its Basic Properties

Def.6.2: For a class \mathcal{C} , if a set A satisfies the following conditions, then it is called \mathcal{C} -complete (under \leq_m^P)

- (a) $\forall L \in \mathcal{C} [L \leq_m^P A]$
- (b) $A \in \mathcal{C}$

Note : Sets satisfying the condition (a) are called \mathcal{C} -hard.

Theorem 6.4. A : any \mathcal{C} -complete set

For any set B we have

- (1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ is \mathcal{C} -hard.
- (2) $A \leq_m^P B \wedge B \in \mathcal{C} \rightarrow B$ is \mathcal{C} -complete.

Once you have a complete problem, you can use it as a **tool!!**

6.2. 多項式時間還元可能性に基づく完全性

6.2.1. 完全性の定義とその基本的性質

定義6.2: 計算量クラス \mathcal{C} に対し、集合 A が次の条件を満たすとき、それを(\leq_m^P の下で) **\mathcal{C} -完全**という。


- (a) $\forall L \in \mathcal{C} [L \leq_m^P A]$
- (b) $A \in \mathcal{C}$

補注: 条件(a)を満たす集合は **\mathcal{C} -困難**。

定理6.4. A : 任意の \mathcal{C} -完全集合

すべての集合 B に対し、

- (1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ は \mathcal{C} -困難。
- (2) $A \leq_m^P B \wedge B \in \mathcal{C} \rightarrow B$ は \mathcal{C} -完全。



ある問題が
完全問題である
ことがわかつたら、
それを**道具**として
使える！

6.2.2. Proof for completeness

Two ways to prove (\mathcal{NP} -)completeness

(I) show ‘for all L ’ according to definition

(II) use some known complete problems

Ex for (I) : Theorem 6.7,

Theorem 6.9(\doteq Cook’s Theorem; simulate TM by SAT)

Easy to handle since,
e.g., 3SAT has a
uniform structure.

Basically...

1. For any program in standard form,
2. simulate it by SAT formulae
 \rightarrow pretty complicated and tedious

Ex for (II): Example 6.4($3\text{SAT} \leq_m^P \text{DHAM}$), Theorem 6.10, ...

DHAM is \mathcal{NP} -complete for general graphs

DHAM is \mathcal{NP} -complete even for planar graphs

DHAM is \mathcal{NP} -complete even for graphs with max degree=3

DHAM is \mathcal{NP} -complete even for bipartite graphs ...

6.2.2. 完全性の証明

(NP)完全性の証明方法

(I) 定義通りに[すべてのL]について示す

(II) すでに完全であることがわかっている問題を利用する

(I)の例: 定理6.7, 定理6.9(=Cookの定理(SATでTMを模倣))

3SATなどは、形式
が一様なので扱い
やすい

基本的には...

1. 多項式時間で動く標準プログラムを考えて
2. プログラムの動作を命題論理式で模倣する
→とても大変(手間がかかる)

(II)の例: 例6.4($3SAT \leq_m^P DHAM$), 定理6.10, ...

DHAMは一般のグラフ上でNP完全

DHAMは平面グラフに限定してもNP完全

DHAMは「頂点の次数=3」に限定してもNP完全

DHAMは2部グラフに限定してもNP完全...

Theorem 6.10 The following sets are all \mathcal{NP} -complete:

- (1) 3SAT, SAT (reduction from ExSAT)
- (2) DHAM, VC (reduction from 3SAT)
- (3) KNAP, BIN (reduction from 3SAT and $\text{KNAP} \leq_m^P \text{BIN}$)

(II) Polynomial time reductions from \mathcal{NP} -complete problems:

1. $3\text{SAT} \leq_m^P \text{VC}$
2. $\text{DHAM} \leq_m^P \text{DHAM}$ with vertices of degree ≤ 5

Vertex Cover: a vertex set that contains
at least one endpoint for each edge

Hamiltonian cycle: a cycle that visits each vertex exactly once

Note : DHAM remains \mathcal{NP} -complete even if max degree 3.
But it is polynomial time solvable if max degree 2.

定理6.10: 以下にあげる集合はすべてNP-完全

- (1) 3SAT, SAT (ExSATからの還元)
- (2) DHAM, VC (3SATからの還元)
- (3) KNAP, BIN (3SATからの還元とKNAP \leq_m^P BIN)

(II) NP完全性がわかっている問題からの多項式時間還元:

1. 3SAT \leq_m^P VC
2. DHAM \leq_m^P 頂点の次数が高々5に制限されたDHAM

Vertex Cover: すべての辺の、少なくとも一方の頂点を含む集合

Hamiltonian cycle: すべての頂点を一度ずつ通る閉路

おまけ: DHAMは次数高々3でもNP完全。
高々2だと多項式時間で計算可能。

Theorem 6.10(2) : VC is \mathcal{NP} -complete

[Proof] Since $VC \in \mathcal{NP}$, we show $3SAT \leq_m^P VC$.

For given formula $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, we construct a pair $\langle G, k \rangle$ of a graph and an integer in polynomial time.

There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Construction of G (F has n variables and m clauses):

1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
2. For each clause $C_j = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$ in F , add vertices l_{i1}, l_{i2}, l_{i3} and three edges $(l_{i1}, l_{i2}), (l_{i2}, l_{i3}), (l_{i3}, l_{i1})$
3. add the edge (l_{i1}, x_i^+) if the literal l_{i1} is x_i , or add (l_{i1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
4. let $k = n + 2m$

定理6.10(2) : VC は \mathcal{NP} 完全問題

[証明] $VC \in \mathcal{NP}$ なので、 $3SAT \leq_m^P VC$ であることを示せばよい。

論理式 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ が与えられたとする。

F から以下の条件を満たすグラフと自然数の組 $\langle G, k \rangle$ が多項式時間で構成できることを示す：

F を1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

G の構成(F は n 変数 m 項とする):

1. F の各変数 x_i に対し、頂点 x_i^+, x_i^- と、辺 (x_i^+, x_i^-) を加える
2. F の各項 $C_j = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$ に対し、頂点 l_{i1}, l_{i2}, l_{i3} と辺 $(l_{i1}, l_{i2}), (l_{i2}, l_{i3}), (l_{i3}, l_{i1})$ を加える
3. 項 C_j のリテラル l_{i1} が x_i のときは辺 (l_{i1}, x_i^+) を、 $\neg x_i$ のときは辺 (l_{i1}, x_i^-) を加える。
4. $k = n + 2m$


There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

4/11

Construction of G (F has n variables and m clauses):

1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
2. For each clause $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ in F , add vertices l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} and three edges $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
3. add the edge (l_{j1}, x_i^+) if the literal l_{j1} is x_i , or add (l_{j1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
4. let $k = n + 2m$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




F を1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

G の構成(F は n 変数 m 項とする):

1. F の各変数 x_i に対し、頂点 x_i^+, x_i^- と、辺 (x_i^+, x_i^-) を加える
2. F の各項 $C_j = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$ に対し、頂点 l_{i1}, l_{i2}, l_{i3} と辺 $(l_{i1}, l_{i2}), (l_{i2}, l_{i3}), (l_{i3}, l_{i1})$ を加える
3. 項 C_j のリテラル l_{i1} が x_i のときは辺 (l_{i1}, x_i^+) を、 $\neg x_i$ のときは辺 (l_{i1}, x_i^-) を加える。
4. $k = n + 2m$

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



It is easy to see that the construction of G from F can be done in polynomial time of the size of F . Hence, we show that...


There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Observation:

From the construction of G ,
any vertex cover S should contain $\begin{cases} \text{at least one of } x_i^+ \text{ or } x_i^- \\ \text{at least 2 of 3 vertices in } C_j \end{cases}$

Hence we have $|S| \geq n+2m = k$.

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




G の構成は、与えられた F から F のサイズに対する多項式時間で可能。したがって以下を示せばよい:

F を1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

観察:

G の構成から任意の頂点被覆 S は $\begin{cases} x_i^+, x_i^- のどちらかを含む \\ C_j の 3 頂点中、最低 2 つ含む \end{cases}$ よって $|S| \geq n + 2m = k$ である。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




If there is an assignment that makes $F()=1$,
 G has a vertex cover of size k

1. Put $\begin{cases} x_i^+ \text{ if } x_i=1 \\ x_i^- \text{ if } x_i=0 \end{cases}$ into S for each x_i .
2. Since each clause $C_j=(l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$ is satisfied, at least one literal, say l_{j1} , the edge (l_{j1}, x_{i1}) is covered by the variable x_{i1} . Therefore, put the remaining literals (l_{j2}, l_{j3}) into S .

\Rightarrow From the Observation, S is a vertex cover of size k .

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




F を1にする割当が存在する $\Rightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

1. それぞれの変数 x_i が $\begin{cases} x_i = 1 \text{なら } x_i^+ \text{を } S \text{に入れる} \\ x_i = 0 \text{なら } x_i^- \text{を } S \text{に入れる} \end{cases}$
2. それぞれの項 $C_j = (l_{i1}, l_{i2}, l_{i3})$ は充足されているので、最低1つのリテラル(l_{i1})については変数との間の辺((l_{i1}, x_{i1}))は x_{i1}^+ によって被覆されている。したがって、それ以外の二つのリテラル(l_{i2}, l_{i3})を S に入る。

\Rightarrow **観察** より、 S はサイズ k の頂点被覆になる。


例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



1. From Observation, a cover S contains $2m$ vertices from the clauses, and n vertices from the variables.
2. Thus the cover S contains exactly one of x_i^+ and x_i^- and exactly two literals of a clause C_j .
3. Hence each clause C_j contains exactly one literal l_i which is not in S , and hence incident edge should be covered by a variable vertex.

\Rightarrow The following assignment satisfies $F:$
$$\begin{cases} x_i = 1 & \text{if } x_i^+ \text{ in } S \\ x_i = 0 & \text{if } x_i^- \text{ in } S \end{cases}$$


$$\text{Ex: } F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$$



G がサイズ k の頂点被覆を持つ $\Rightarrow F$ を1にする割当が存在する


1. 観察 より、被覆 S は項から $2m$ 個、変数から n 個の頂点を含む。
2. さらに各変数 x_i については x_i^+ か x_i^- の一方しか、各項 C_j についてはちょうど2つの頂点しか S に含むことができない。
3. よって各項 C_j は S に含まれないリテラル l_i を含むが、これに付随する辺は他方が被覆されていなければならぬ。
 $\Rightarrow \begin{cases} x_i^+ \text{が } S \text{ に含まれるなら } x_i = 1 \\ x_i^- \text{が } S \text{ に含まれるなら } x_i = 0 \end{cases}$ という割当は F を充足する。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



Unsatisfiable example:


$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, x_3) = & (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \\ & \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \end{aligned}$$



When F is unsatisfiable, it contains at least one clause such that each literal is not covered by a vertex. So, Vertex Cover should contain three literals in the clause. Hence any vertex cover has size at least $k+1$.

充足できない例:

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \\ \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$



充足できない F では、どのリテラルも頂点でカバーされていない項が必ず存在する。この項のリテラルは3つとも Vertex Cover に入れざるを得ない。よって Vertex Cover のサイズは $k+1$ 以上になる。

Theorem: DHAM on a directed graph with max. degree=5
 (abb. $\text{DHAM}_{\leq 5}$) is \mathcal{NP} -complete

[Proof]

Since $\text{DHAM} \in \mathcal{NP}$, $\text{DHAM}_{\leq 5} \in \mathcal{NP}$.


We $\text{DHAM} \leq_m^P \text{DHAM}_{\leq 5}$.

degree: the number of edges incident to a vertex

Idea:

Replace the set of “arcs to v” and the set of “arcs from v” by a right ‘gadget’.

A Hamiltonian cycle through v on the original graph corresponds to the Hamiltonian cycle through v on the resultant graph.



定理: 次数高々5の有向グラフ上の DHAM は NP 完全問題

[証明] (上記の問題を $\text{DHAM}_{\leq 5}$ と略記する)

$\text{DHAM}_{\leq 5}$ が NP に属するのは、 DHAM が NP に属することから自明。したがって完全性を示せばよい。


$\text{DHAM} \leq_m^P \text{DHAM}_{\leq 5}$ を示す。

次数: 頂点に付随する辺の本数

アイデア:

次数14の頂点 v (左) の
(入ってくる辺集合) と
(出ていく辺集合) を右図
の `gadget' で置き換える

左図で v を1度だけ通る
閉路と右図で v を1度だけ通る閉路は対応する。




Theorem: DHAM on a directed graph with max. degree=5
 (abb. DHAM ≤ 5) is \mathcal{NP} -complete

Idea:

Points:

- Up to down via cycle
- Each vertex has deg ≤ 5



[Proof (sketch)]

For each vertex v of degree ≥ 6 , replace the edges around v by the gadget.

1. If the original graph G has n vertices with m edges, the resultant graph G' contains $O(n+m)$ vertices with $O(m)$ edges. Hence the reduction can be done in polynomial time of n & m .
2. Each vertex in G' has degree *at most* 5.
3. G has a Hamiltonian cycle $\Leftrightarrow G'$ has a Hamiltonian cycle. QED.


定理: 次数高々5の有向グラフ上の DHAM は \mathcal{NP} 完全問題

アイデア:

ポイント:

- 各閉路は上から下
- 各頂点は次数 ≤ 5

[証明(概要)]



与えられたグラフ G の次数が6以上のそれぞれの頂点に入る辺と出る辺を上記の gadget で置き換える。

- 元のグラフ G が n 頂点 m 辺であったなら、gadget で置き換えたあとのグラフ G' は $O(n+m)$ 頂点 $O(m)$ 辺となる。したがって上記の還元は G の大きさの多項式時間で可能。
- また G' のすべての頂点は次数はたかだか5である。
- G がハミルトン閉路をもつ $\Leftrightarrow G'$ がハミルトン閉路を持つ QED.

Addition (おまけ)

- R. Uehara, S. Iwata:

Generalized Hi-Q is NP-complete,

The Transactions of the IEICE, E73, p.270-273, 1990.

- P. Zhang, H. Sheng, R. Uehara:

A Double Classification Tree Search Algorithm for Index SNP Selection, *BMC Bioinformatics*, 5:89, 2004.

- R. Uehara, S. Teramoto:

Computational Complexity of a Pop-up Book,

4th International Conference on Origami in Science, Mathematics, and Education, 2006.

- R. Uehara:

Simple Geometrical Intersection Graphs,

3rd Workshop on Algorithms and Computation,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4921, p.25-33, 2008.

- E. Demaine, M. Demaine, R. Uehara, T. UNO, Y. UNO:

UNO is hard, even for a single player,

5th International Conference on FUN with algorithms,

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6099, pp. 28-36, 2010.

- S. Teramoto, E. D. Demaine, R. Uehara:

Voronoi Game on Graphs and Its Complexity,

Journal of Graph Algorithms and Applications, Vol. 15, No. 4, pp.485-501, 2011

Many natural hard problems are either

- Poly-time solvable, or
- \mathcal{NP} -hard



Copyright © 2003 by Robert Sabuda



Schedule(残りの予定)

- 10/27(Thu): Last class (前半最後の講義)
 - Submission of the report (2) (レポート(2)提出)
 - Course Evaluation Questionnaire (授業アンケート)
 - Office Hour: Comments/Answers on reports
- 10/31(Mon): mid-term exam (中間試験)
 - 40 points  Notes, Textbook, Copy, Printout,...
 - Only pens and pencils (持ち込み不可)
 - Lesson 3~Lesson 6 (講義3~講義6)

You will find necessary definitions at
the last page of the test.