

I216 Computational Complexity  
and  
Discrete Mathematics

by  
Prof. Ryuhei Uehara  
and  
Prof. Atsuko Miyaji

I216 計算量の理論と離散数学

上原隆平、宮地充子

# Computational Complexity

- Goal 1:
  - “*Computable Function/Problem/Language/Set*”
- Goal 2:
  - How can you show “*Difficulty of Problem*”
    - There are *intractable* problems even if they are computable!
      - because they require too many resources (time/space)!
    - Technical terms;  
The class NP, P≠NP conjecture, NP-hardness, reduction

# 計算量の理論

- ゴール1:
  - “計算可能な関数/問題/言語/集合”
- ゴール2:
  - 「問題の困難さ」を示す方法を学ぶ
    - 計算可能な問題であっても、手におえない場合がある！
      - 計算に必要な資源(時間・領域)が多すぎるとき
    - 関連する専門用語;  
**クラスNP, P≠NP予想, NP困難性, 還元**

# 6. Analysis on Polynomial-Time Computability

## 6.2. Completeness

**Definition** For a class  $C$ , if a set  $A$  satisfies

(a)  $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$ ,

the set  $A$  is called  **$C$ -hard** (under  $\leq_m^P$ ). Moreover, if we have

(b)  $A \in C$ ,

then  $A$  is called  **$C$ -complete**.

**Theorem**  $A$ : any  $C$ -complete set

For any set  $B$  we have

(1)  $A \leq_m^P B \rightarrow B$  is  $C$ -hard.

(2)  $A \leq_m^P B$  and  $B \in C \rightarrow B$  is  $C$ -complete.

Once you have an NP-complete problem  $A$ , it can be used to measure to the other problems

# 6. 多項式時間計算可能性の解析

## 6.2. 完全性

**定義** クラスCに対して、集合Aが以下を満たすとき

(a)  $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$

集合Aは( $\leq_m^P$  のもとで)C困難であるという。さらに

(b)  $A \in C$

であれば、AはC完全であるという。

**定理** A: 任意のC完全集合

任意の集合Bに対して以下が成立

(1)  $A \leq_m^P B \rightarrow B$  はC困難。

(2)  $A \leq_m^P B$  かつ  $B \in C \rightarrow B$  はC完全。

ひとたびNP完全問題Aが示されれば、それを用いて他の問題を測ることができる。

# 6. Analysis on Polynomial-Time Computability

## 6.2. Completeness

There are two ways to prove (NP-)completeness:

1. show ‘for all L’ according to the definition
  - Cook’s Theorem; he simulated Turing machine by SAT in 1971!

Easy to handle since, e.g.,  
3SAT has a uniform structure.

Basically...

1. For any program in standard form,
2. simulate it by SAT formulae  
 $\rightarrow$  pretty complicated and tedious

2. use some known complete problem as a seed

- $3\text{SAT} \leq_m^P \text{DHAM}$ ,  $3\text{SAT} \leq_m^P \text{VC}$ , ...
- Thousands of NP-complete problems are reduced from 3SAT!
- E.g., from “DHAM is NP-complete for general graphs”, we have
  - DHAM is NP-complete even for planar graphs
  - DHAM is NP-complete even for graphs with max degree=3
  - DHAM is NP-complete even for bipartite graphs...

max  
degree=5

# 6. 多項式時間計算可能性の解析

## 6.2. 完全性

(NP)完全性を示す二つの方法:

### 1. 定義に忠実に「すべての*L*」に対して示す

- クックの定理; 彼は1971年にSATでチューリングマシンのシミュレータを構築した!

例えば3SATは一様な構造を持っているので、扱いやすい。

基本的には...

- 標準形で書かれたプログラムを
- SATの命題論理式で模倣  
→非常に複雑&面倒

### 2. すでに完全性が示されている問題をタネに使う

- $3SAT \leq_m^P DHAM$ ,  $3SAT \leq_m^P VC$ , ...
- 千を超えるNP完全問題が3SATからの還元で示されている!
- 例えば「一般のグラフ上でDHAMはNP完全」という結果から:
  - DHAMは平面グラフ上に限定してもNP完全
  - DHAMは最大次数3に限定してもNP完全
  - DHAMは二部グラフに限定してもNP完全...

最大次数5

# 6. Analysis on Polynomial-Time Computability

## 6.2. Completeness

Theorem VC is NP-complete

[Proof] Since  $\text{VC} \in \text{NP}$ , we show  $\text{3SAT} \leq_m^P \text{VC}$ .

For given formula  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , we construct a pair  $\langle G, k \rangle$  of a graph and an integer in polynomial time such that:

There is an assignment that makes  $F()=1$   
 $\Leftrightarrow G$  has a vertex cover of size  $k$

Construction of  $G$  ( $F$  has  $n$  variables and  $m$  clauses):

1. add vertices  $x_i^+, x_i^-$  and the edge  $(x_i^+, x_i^-)$  for each variable  $x_i$  in  $F$
2. For each clause  $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$  in  $F$ , add vertices  $l_{j1}, l_{j2}, l_{j3}$  and three edges  $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
3. add the edge  $(l_{j1}, x_i^+)$  if the literal  $l_{j1}$  is  $x_i$ , or add  $(l_{j1}, x_i^-)$  if it is  $\neg x_i$  for each clause  $C_j$
4. let  $k = n + 2m$

# 6.多項式時間計算可能性の解析

## 6.2.完全性

定理 VCはNP完全問題

[証明]  $VC \in NP$ なので  $3SAT \leq_m^P VC$ を示せばよい.

与えられた論理式  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  から以下の条件を満たす  
グラフと整数の組 $\langle G, k \rangle$ を多項式時間で構成する:

$F()=1$  とする割当てが存在する  
 $\Leftrightarrow G$  が大きさ  $k$  の頂点被覆をもつ

$G$ の構成方法 ( $F$  は  $n$  変数・ $m$  項からなる):

1.  $F$ の各変数  $x_i$  に対して、頂点  $x_i^+, x_i^-$  と辺  $(x_i^+, x_i^-)$  を追加する
2.  $F$ の各項  $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$  に対して、頂点  $l_{j1}, l_{j2}, l_{j3}$  と3辺  $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$  を追加する
3. 各項  $C_j$ に対して、リテラル  $l_{j1}$  が  $x_i$ なら辺  $(l_{j1}, x_i^+)$  を、 $\neg x_i$ なら辺  $(l_{j1}, x_i^-)$  を追加する
4.  $k = n + 2m$  とする


# Theorem VC is NP-complete

There is an assignment that makes  $F()=1$   
 $\Leftrightarrow G$  has a vertex cover of size  $k$

Construction of  $G$  ( $F$  has  $n$  variables and  $m$  clauses):

1. add vertices  $x_i^+, x_i^-$  and the edge  $(x_i^+, x_i^-)$  for each variable  $x_i$  in  $F$
2. For each clause  $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$  in  $F$ , add vertices  $l_{j1}, l_{j2}, l_{j3}$  and three edges  $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
3. add the edge  $(l_{j1}, x_i^+)$  if the literal  $l_{j1}$  is  $x_i$ , or add  $(l_{j1}, x_i^-)$  if it is  $\neg x_i$  for each clause  $C_j$
4. let  $k = n + 2m$

Ex:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




# 定理 VCはNP完全問題

$F()=1$  とする割当てが存在する  
 $\Leftrightarrow G$  が大きさ  $k$  の頂点被覆をもつ

$G$  の構成方法 ( $F$  は  $n$  変数・ $m$  項からなる):

1.  $F$  の各変数  $x_i$  に対して、頂点  $x_i^+, x_i^-$  と辺  $(x_i^+, x_i^-)$  を追加する
2.  $F$  の各項  $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$  に対して、頂点  $l_{j1}, l_{j2}, l_{j3}$  と3辺  $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$  を追加する
3. 各項  $C_j$  に対して、リテラル  $l_{j1}$  が  $x_i$  なら辺  $(l_{j1}, x_i^+)$  を、 $\neg x_i$  なら辺  $(l_{j1}, x_i^-)$  を追加する
4.  $k = n + 2m$  とする

例:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



# Theorem VC is NP-complete

It is easy to see that the construction of  $G$  from  $F$  can be done in polynomial time of the size of  $F$ . Hence, we show that...

There is an assignment that makes  $F()=1$   
 $\Leftrightarrow G$  has a vertex cover of size  $k$


Observation:

From the construction of  $G$ ,  
any vertex cover  $S$  should contain  $\begin{cases} \text{at least one of } x_i^+ \text{ or } x_i^- \\ \text{at least 2 of 3 vertices in } C_j \end{cases}$

Hence we have  $|S| \geq n+2m = k$ .

We have no extra vertex!!

Ex:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



# 定理 VCはNP完全問題

$F$ から $G$ の構成は、明らかに多項式時間で可能である。

したがって、以下を証明すればよい：

$F()=1$ とする割当がある  
 $\Leftrightarrow G$  が大きさ $k$ の頂点被覆をもつ

観測：


$G$ の構成方法から、頂点被覆  $S$  は  
以下の頂点を必ず含む

$\begin{cases} x_i^+ \text{ or } x_i^- \text{ から少なくとも一つ} \\ C_j \text{ の三つの頂点から少なくとも二つ} \end{cases}$

よって  $|S| \geq n+2m = k$

余分な頂点は一つもない！

例：  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




# Theorem VC is NP-complete

There is an assignment that makes  $F()=1$

→  $G$  has a vertex cover of size  $k$

1. Put  $\begin{cases} x_i^+ \text{ if } x_i=1 \\ x_i^- \text{ if } x_i=0 \end{cases}$  into  $S$  for each  $x_i$ .
  2. Since each clause  $C_j = (l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$  is satisfied, at least one literal, say  $l_{j1}$ , the edge  $(l_{j1}, x_{i1})$  is covered by the variable  $x_{i1}$ . Therefore, put the remaining literals  $(l_{j2}, l_{j3})$  into  $S$ .
- ⇒ From the **Observation**  $S$  is a vertex cover of size  $k$ .

Ex:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




# 定理 VCはNP完全問題

$F()=1$ とする割当てがある  
⇒  $G$  が大きさ  $k$  の頂点被覆をもつ

- 各  $x_i$  に対して  $\left\{ \begin{array}{l} x_i = 1 \text{ なら } x_i^+ \\ x_i = 0 \text{ なら } x_i^- \end{array} \right\}$  を  $S$  に
- 各項  $C_j = (l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$  は充足されているので、少なくとも一つのリテラル  $l_{j1}$  に対して辺  $(l_{j1}, x_{j1})$  は変数  $x_{j1}$  で被覆されている。そこで残りの二つのリテラル  $(l_{j2}, l_{j3})$  を  $S$  に

⇒ 観測 より  $S$  は大きさ  $k$  の頂点被覆。

例:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




# Theorem VC is NP-complete

If  $G$  has a vertex cover of size  $k$ , there is an assignment that makes  $F()=1$

1. From **Observation**, a cover  $S$  contains  $2m$  vertices from the clauses, and  $n$  vertices from the variables.
2. Thus the cover  $S$  contains exactly one of  $x_i^+$  and  $x_i^-$  and exactly two literals of a clause  $C_j$ .
3. Hence each clause  $C_j$  contains exactly one literal  $l_i$  which is not in  $S$ , and hence incident edge should be covered by a variable vertex.

⇒ The following assignment satisfies  $F$ : 
$$\begin{cases} x_i = 1 & \text{if } x_i^+ \text{ in } S \\ x_i = 0 & \text{if } x_i^- \text{ in } S \end{cases}$$

Ex:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




# 定理 VCはNP完全問題

$G$  が大きさ  $k$  の頂点被覆をもつなら,  $F()=1$  とする割当てが存在する

1. 観測 より, 被覆  $S$  は各項から  $2m$  頂点含み, 変数から  $n$  頂点含む.
2. よって被覆  $S$  は  $x_i^+$  と  $x_i^-$  からちょうど一つと, 各項  $C_j$  からちょうど二つのリテラルを含む
3. つまり各項  $C_j$  は  $S$  に含まれないリテラル  $|_j$  をちょうど一つだけ含み, そこにつながる辺は変数頂点で被覆されている.

⇒ 以下の条件を満たす割当ては  $F$  を充足する:  $\begin{cases} x_i^+ \in S \text{ なら } x_i = 1 \\ x_i^- \in S \text{ なら } x_i = 0 \end{cases}$


例:  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



# Theorem VC is NP-complete... Addition

What happen if the formula is not satisfiable?

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$




If  $F$  is unsatisfiable, it contains at least one clause s. t. each literal is *not* covered by a vertex. So, Vertex Cover should contain *three* literals in the clause. Hence any vertex cover has size at least  $k+1$ .

# 定理 VCはNP完全問題... 補足

命題論理式が充足可能でないときにはどうなるのか?

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$



$F$  が充足可能でないときには、ある項において頂どのリテラルも変数側の頂点によって被覆されない。よって頂点被覆集合はこの項のリテラルを三つともふくまなければならぬ。したがって頂点被覆集合は少なくとも大きさ  $k+1$  になる。

# 6. Analysis on Polynomial-Time Computability

## 6.2. Completeness

### Theorem

DHAM is NP-complete even if maximum degree=5.

[Proof]

Since DHAM  $\in$  NP, DHAM  $\leq_P^P$  DHAM  $\leq_5$   $\in$  NP.


We show DHAM  $\leq_m$  DHAM  $\leq_5$ .

Idea:

Replace the set of “arcs to v” and the set of “arcs from v” by a right ‘gadget’.

A Hamiltonian cycle through v on the original graph corresponds to the Hamiltonian cycle through v on the resultant graph.

**degree**: the number of edges incident to a vertex



# 6. 多項式時間計算可能性の解析

## 6.2. 完全性

### 定理

DHAM はグラフの最大次数が 5 でも NP 完全

[証明]


$\text{DHAM} \in \text{NP}$  なので  $\text{DHAM}_{\leq 5} \in \text{NP}$ .  
よって  $\text{DHAM} \leq_P \text{DHAM}_{\leq 5}$  を示す

アイデア

「 $v$ に入る辺」や「 $v$ から出る辺」を  
しかるべきガジェットで置き換える


元のグラフで  $v$  を通る  
ハミルトン閉路は、  
置き換えたグラフで  $v$  を  
通るハミルトン閉路に  
対応づけられる。

次数: 頂点につながる  
辺の本数



## 6.2. Completeness

Theorem DHAM is NP-complete even if max. degree=5.



[Proof (sketch)]


For each vertex  $v$  of degree  $\geq 6$ , replace the edges around  $v$  by the gadget.

1. If the original graph  $G$  has  $n$  vertices with  $m$  edges, the resultant graph  $G'$  contains  $O(n+m)$  vertices with  $O(m)$  edges. Hence the reduction can be done in polynomial time of  $n$  &  $m$ .
2. Each vertex in  $G'$  has degree **at most 5**.
3.  $G$  has a Hamiltonian cycle  $\Leftrightarrow G'$  has a Hamiltonian cycle.

QED.

## 6.2.完全性

定理 DHAM はグラフの最大次数が5でも NP完全



次数 $\geq 6$ の各頂点  $v$  に対して,  $v$  の頂点の周りの辺をガジェットで置き換える

- もとのグラフ  $G$  の頂点数を  $n$ , 辺数を  $m$  とすると, 還元後に得られるグラフ  $G'$  の頂点数は  $O(n+m)$  で辺数は  $O(m)$  となる. よってこの還元は  $n$  と  $m$  の多項式時間で実行できる.
- $G'$  の各頂点の次数は たかだか 5.
- $G$  がハミルトン閉路をもつ  $\Leftrightarrow G'$  がハミルトン閉路をもつ

QED.

## Addition (おまけ)

- R. Uehara, S. Iwata:

Generalized Hi-Q is NP-complete,

*The Transactions of the IEICE*, E73, p.270-273, 1990.

- P. Zhang, H. Sheng, R. Uehara:

A Double Classification Tree Search Algorithm for  
Index SNP Selection, *BMC Bioinformatics*, 5:89, 2004.

- R. Uehara, S. Teramoto:

Computational Complexity of a **Pop-up Book**,

*4<sup>th</sup> International Conference on Origami in Science, Mathematics, and Education*, 2006.

- E. Demaine, M. Demaine, R. Uehara, T. **UNO**, Y. **UNO**:

**UNO** is hard, even for a single player,

*5<sup>th</sup> International Conference on FUN with algorithms*,  
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6099,  
pp. 28-36, 2010.

- E. D. Demaine, Y. Okamoto, R. Uehara, and Y. Uno:

Computational complexity and an integer programming model of Shakashaka,  
*presented on Wednesday!*, 2013.

Many natural hard problems are either

- Poly-time solvable, or
- NP-hard



# Schedule(残りの予定)

- 4/25(Thu): Last class (前半最後の講義)
  - Submission of the report (2) (レポート(2)提出)
  - Course Evaluation Questionnaire (授業アンケート)
  - Office Hour: Comments/Answers on report (2)
- 5/2(Thu): mid-term exam (中間試験)
  - 40 points  Notes, Textbook, Copy, Printout,...
  - Only pens and pencils (持ち込み不可)
  - Lesson 3~Lesson 6 (講義3~講義6),  
which means that “no diagonalization”