

I216 計算量の理論と離散数学

上原隆平、宮地 充子

I216 Computational Complexity
and
Discrete Mathematics

by
Prof. Ryuhei Uehara
and
Prof. Atsuko Miyaji

計算量の理論

- ゴール1:
 - “計算可能な関数/問題/言語/集合”
- ゴール2:
 - 「問題の困難さ」を示す方法を学ぶ
 - 計算可能な問題であっても、手におえない場合がある！
 - 計算に必要な資源(時間・領域)が多すぎるとき
 - 関連する専門用語;
クラスNP, P≠NP予想, NP困難性, 還元

Computational Complexity

- Goal 1:
 - “*Computable Function/Problem/Language/Set*”
- Goal 2:
 - How can you show “*Difficulty of Problem*”
 - There are *intractable* problems even if they are computable!
 - because they require too many resources (time/space)!
 - Technical terms;
The class NP, P \neq NP conjecture, NP-hardness, reduction

5.計算量の理論

- 計算量クラスの定義を概観すると...

クラスPの定義

集合 L がクラスPに入る \Leftrightarrow

以下を満たす多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ で $x \in L \Leftrightarrow R(x)$

クラスNPの定義

集合 L がクラスNPに入る \Leftrightarrow

以下を満たす多項式 q と多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ で $x \in L \Leftrightarrow \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x, w)]$

クラスcoNPの定義

集合 L がクラスcoNPに入る \Leftrightarrow

以下を満たす多項式 q と多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ で $x \in L \Leftrightarrow \forall w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x, w)]$

5. Computational Complexity

- **Observation of the classes**

Definition: Class P

Set L is in the class P \Leftrightarrow

There exists a poly-time computable predicate R such that
for each $x \in \Sigma^*, x \in L \Leftrightarrow R(x)$

Definition: Class NP

Set L is in the class NP \Leftrightarrow

There exists a poly q and a poly-time computable predicate R such that
for each $x \in \Sigma^*, x \in L \Leftrightarrow \exists w \in \Sigma^*: |w| \leq q(|x|)[R(x,w)]$

Definition: Class coNP

Set L is in the class coNP \Leftrightarrow

There exists a poly q and a poly-time computable predicate R such that
for each $x \in \Sigma^*, x \in L \Leftrightarrow \forall w \in \Sigma^*: |w| \leq q(|x|)[R(x,w)]$

5. 計算量の理論

5.5. 計算量クラスの関係

定理

- (1) $NP \subseteq coNP \rightarrow NP = coNP$
- (2) $coNP \subseteq NP \rightarrow NP = coNP$
- (3) $NP \neq coNP \rightarrow P \neq NP$

注: (3)より $NP \neq co-NP$ の証明は $P \neq NP$ の証明よりも難しい。

証明: (3) $NP \neq coNP \rightarrow P \neq NP$

以下の対偶を示す: $P = NP \rightarrow NP = coNP$

$P=NP$ と仮定すると、任意の集合 L に対して以下を得る

$$L \in NP \Leftrightarrow L \in P \quad (P = NP)$$

$$\Leftrightarrow \bar{L} \in P \quad (P = coP)$$

$$\Leftrightarrow \bar{L} \in NP \quad (P = NP)$$

$$\Leftrightarrow L (= \bar{\bar{L}}) \in coNP \quad (NP/coNPの定義より)$$

$\therefore NP = coNP$

Q.E.D.

5. Computational Complexity

5.5. Relations in the Complexity Classes

Theorem

- (1) $NP \subseteq coNP \rightarrow NP = coNP$
- (2) $coNP \subseteq NP \rightarrow NP = coNP$
- (3) $NP \neq coNP \rightarrow P \neq NP$

Note: From (3), proof for $NP \neq co-NP$ is harder than that for $P \neq NP$.

Proof: (3) $NP \neq coNP \rightarrow P \neq NP$

Contraposition: $P = NP \rightarrow NP = coNP$

If we assume $P=NP$, for any L we have

$$\begin{aligned} L \in NP &\Leftrightarrow L \in P \quad (P = NP) \\ &\Leftrightarrow \bar{L} \in P \quad (P = coP) \\ &\Leftrightarrow \bar{L} \in NP \quad (P = NP) \\ &\Leftrightarrow L (= \bar{L}) \in coNP \quad (\text{Definitions of } NP/coNP) \end{aligned}$$

$\therefore NP = coNP$

Q.E.D.


5. 計算量の理論

5.5. 計算量クラスの関係


定理

- (1) $NP \subseteq coNP \rightarrow NP = coNP$
- (2) $coNP \subseteq NP \rightarrow NP = coNP$
- (3) $NP \neq coNP \rightarrow P \neq NP$

$P \neq NP$ が成立すると強く信じられているので、以下の構造になっていると予想される。



または




5. Computational Complexity

5.5. Relations in the Complexity Classes


Theorem

- (1) $\text{NP} \subseteq \text{coNP} \rightarrow \text{NP} = \text{coNP}$
- (2) $\text{coNP} \subseteq \text{NP} \rightarrow \text{NP} = \text{coNP}$
- (3) $\text{NP} \neq \text{coNP} \rightarrow \text{P} \neq \text{NP}$

We strongly believe that $\text{P} \neq \text{NP}$, and then we have



or



6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定義

A と B を任意の集合とする.

(1) 関数 $h: A \rightarrow B$ が 多項式時間還元 である

$\Leftrightarrow \begin{cases} (a) h \text{ は } \Sigma^* \text{ から } \Sigma^* \text{ への全域関数である} \\ (b) x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ (c) h \text{ は多項式時間計算可能である.} \end{cases}$

(2) A から B への多項式時間還元が存在するとき

A は B へ多項式時間還元可能 であるといい,

$$A \leq_m^P B \quad \text{とかく.}$$

(...多項式時間程度の差を無視すれば, A の難しさ $\leq B$ の難しさ)

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Definition

Let A and B be arbitrary sets.

(1) function $h: A \rightarrow B$: polynomial-time reduction

- \Leftrightarrow $\begin{cases} \text{(a) } h \text{ is a total function from } \Sigma^* \text{ onto } \Sigma^* \\ \text{(b) } x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ \text{(c) } h \text{ is polynomial-time computable.} \end{cases}$

(2) When there is a poly-time reduction from A to B ,
we say A is polynomial-time reducible to B .

Then, we denote by

$$A \leq_m^P B$$

(...within polynomial time, hardness of $A \leqq$ that of B)

6.多項式時間計算可能性の解析手法

6.1.多項式時間還元可能性

定理 $A \leq_m^P B$ のとき次が成立する

- (1) $B \in P \rightarrow A \in P.$
- (2) $B \in NP \rightarrow A \in NP.$
- (3) $B \in \text{co-NP} \rightarrow A \in \text{coNP}.$
- (4) $B \in EXP \rightarrow A \in EXP.$

注意: クラス E は例外. 一般に $B \in E \rightarrow A \in E$ は成立しない.

例: $\text{ONE} \equiv \{1\}$ と定義すると, Pの各集合Lに対して,

$$L \leq_m^P \text{ONE}$$

である. ここで $h(x) \equiv \begin{cases} 1, & \text{if } x \in L \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem $A \leq_m^P B$ leads to

- (1) $B \in P \rightarrow A \in P$.
- (2) $B \in NP \rightarrow A \in NP$.
- (3) $B \in \text{co-NP} \rightarrow A \in \text{coNP}$.
- (4) $B \in EXP \rightarrow A \in EXP$.

Note : class E is exceptional. Generally, $B \in E \rightarrow A \in E$ is not true.

Ex.: When we define $\text{ONE} \equiv \{1\}$, for each set L in P we have

$$L \leq_m^P \text{ONE}$$

if we define $h(x) \equiv \begin{cases} 1, & \text{if } x \in L \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

6.多項式時間計算可能性の解析手法

6.1.多項式時間還元可能性

定理 A, B, C を任意の集合とする.

$$(1) A \leq_m^P A$$

$$(2) A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P C \rightarrow A \leq_m^P C$$

定義

$$A \equiv_m^P B \leftrightarrow A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P A$$

\equiv_m^P は同値関係.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem A, B, C : arbitrary sets

$$(1) A \leq_m^P A$$

$$(2) A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P C \rightarrow A \leq_m^P C$$

Definition

$$A \equiv_m^P B \leftrightarrow A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P A$$

\equiv_m^P is an equivalence relation.

6.多項式時間計算可能性の解析手法

6.1.多項式時間還元可能性

定理

- (1) $2\text{SAT} \leq_m^P 3\text{SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$
- (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

証明

- (1) 定義によっていくつかの証明が考えられる:
 - (a) 定義が「各項に高々3リテラル」の場合は、 2SAT の入力は 3SAT の入力としても有効なので、特に示すことはない。
 - (b) 各項 $(x \vee y)$ を単に $(x \vee y \vee y)$ で置き換えること。
 - (c) 各項 $(x \vee y)$ に対して新しい変数を導入して
 $(x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \neg z)$.
と置き換えること。
- どの場合も多項式時間還元で、元の論理式が充足可能である必要十分条件は、新しい式が充足可能であること。

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem

- (1) $2\text{SAT} \leq_m^P 3\text{SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$
- (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Proof

- (1) we have some proofs depending on definition:
 - (a) each instance of 2SAT is also in 3SAT if the definition is “at most 3 literals in a clause”.
 - (b) each clause $(x \vee y)$ can be replaced by $(x \vee y \vee y)$.
 - (c) each clause $(x \vee y)$ can be replaced by $(x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \bar{z})$.

In any case, they are poly-time reduction, and the original formula is satisfiable iff so is the resulting formula.

6.多項式時間計算可能性の解析手法

6.1.多項式時間還元可能性

定理

- (1) $2\text{SAT} \leq_m^P 3\text{SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$
- (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

証明(概略)

(2) (1)より, $\text{ExSAT} \leq_m^P 3\text{SAT}$ が成立することを示せばよい.
基本戦略:

ExSAT の式 F が与えられたら, それに基づいて 3SAT の式 F' を構成する. ただしここで F が充足可能である必要十分条件が F' が充足可能であるようにする. そのために, まず F の計算木を構築し, 次に F の計算手順を表現する論理式 F' を構築する.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem

- (1) $2\text{SAT} \leq_m^P 3\text{SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$
- (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Proof (Outline)

(2) It is sufficient to show that $\text{ExSAT} \leq_m^P 3\text{SAT}$ by (1).

Strategy:

For any given F in ExSAT, we construct another F' in 3SAT such that F is satisfiable iff F' is satisfiable.

To do that, we first construct the computation tree of F , and construct F' that represents the computation process of F .

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性


定理 (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

証明 (概略)

(2) $\text{ExSAT} \leq_m^P 3\text{SAT}$ が成立することを示せばよい.

ExSAT から 3SAT への還元を例で示す:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility


Theorem (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Proof (Outline)

(2) It is sufficient to show that $\text{ExSAT} \leq_m^P 3\text{SAT}$ by (1).

Reduction from ExSAT to 3SAT by an example:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



6. 多項式時間計算可能性の解析手法


6.1. 多項式時間還元可能性

定理 (2)

$$3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$$

ExSAT から 3SAT への還元を例で示す:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



$$\begin{aligned} F''(x_1, x_2, x_3) &\equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ &\quad \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]] \end{aligned}$$


6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Reduction from ExSAT to 3SAT by an example:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [(x_1 \leftrightarrow x_2) \rightarrow (x_2 \wedge x_3)] \vee \neg x_3$$



$$\begin{aligned} F''(x_1, x_2, x_3) \equiv & U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ & \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]] \end{aligned}$$

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理 (2)

$$3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$$

ExSAT から 3SAT への還元を例で示す:

$$\begin{aligned} F''(x_1, x_2, x_3) &\equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ &\quad \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]] \end{aligned}$$

このとき構成から, $F()$ は充足可能 $\Leftrightarrow F''()$ は充足可能.
 $F''()$ をこれと同値な3SATの要素 $F'()$ で表現する.

$$\begin{aligned} U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3] &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg [U_2 \vee \neg x_2]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee [\neg U_2 \wedge x_2]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_2] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_2 \vee x_2] \end{aligned}$$

他のケースも同様に変形でき, $F'()$ は3SATの要素となる.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Reduction from ExSAT to 3SAT by an example:

$$\begin{aligned} F''(x_1, x_2, x_3) &\equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ &\quad \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]] \end{aligned}$$

Then, by construction, $F()$ is satisfiable iff $F''()$ is satisfiable.

We show $F''()$ can be represented by an equivalent $F'()$ in 3SAT.

$$\begin{aligned} U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3] &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg [U_2 \vee \neg x_2]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee [\neg U_2 \wedge x_2]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_2] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_2 \vee x_2] \end{aligned}$$

The other cases are similar, and $F'()$ is in 3SAT.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

定義

クラス C に対して、集合 A が次を満たすとき

$$(a) \forall L \in C [L \leq_m^P A]$$

集合 A は (\leq_m^P のもとで) **C 困難** であるという。

さらに次を満たすなら

$$(b) A \in C$$

A は **C 完全** であるという。

例. NP完全集合の例

3SAT, SAT, ExSAT, DHAM, KNAP, BIN, VC など

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Definition

For a class C , if a set A satisfies

(a) $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$,

the set A is called **C -hard** (under \leq_m^P).

Moreover, if we have

(b) $A \in C$,

then A is called **C -complete**.

Ex. Examples of NP-complete sets

3SAT, SAT, ExSAT, DHAM, KNAP, BIN, VC, etc.

6.多項式時間計算可能性の解析手法

6.2.完全性

6.2.1.定義と基本性質

定理 C困難(またはC完全)な任意の集合Aに対して,

- | | |
|---|--|
| (1) $A \in P \rightarrow C \subseteq P$ | 対偶: $C \not\subseteq P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \subseteq NP$ | 対偶: $C \not\subseteq NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \subseteq coNP$ | 対偶: $C \not\subseteq coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \subseteq EXP$ | 対偶: $C \not\subseteq EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

証明:

(1) 任意のC集合を B とする. A がC困難であることから,

$B \leq_m^P A$ であり, $A \in P$ という仮定より $B \in P$ をえる.

(2), (3), (4) も同様.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Theorem. For any C-hard (or C-complete) set A ,

- | | |
|---|--|
| (1) $A \in P \rightarrow C \subseteq P$ | CP: $C \not\subseteq P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \subseteq NP$ | CP: $C \not\subseteq NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \subseteq coNP$ | CP: $C \not\subseteq coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \subseteq EXP$ | CP: $C \not\subseteq EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

Proof: CP: contraposition

- (1) Let B be any C-set. Then, since A is C-hard,

$B \leq_m^P A$ and by the assumption $A \in P$, we have $B \in P$

- (2), (3), (4) are similar.

6.多項式時間計算可能性の解析手法

6.2.完全性

6.2.1.定義と基本性質

定理 C困難(またはC完全)な任意の集合Aに対して,

- | | |
|---|--|
| (1) $A \in P \rightarrow C \subseteq P$ | 対偶: $C \not\subseteq P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \subseteq NP$ | 対偶: $C \not\subseteq NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \subseteq coNP$ | 対偶: $C \not\subseteq coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \subseteq EXP$ | 対偶: $C \not\subseteq EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

例: クラスNPに関する定理の意味するところ

NP完全集合をAとする.

定理(1)の対偶より: $NP \neq P \rightarrow A \notin P$

つまり, NP完全集合はP=NPでない限り,

多項式時間では認識できないNP集合である.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Theorem. For any C-hard (or C-complete) set A ,

- | | |
|---|--|
| (1) $A \in P \rightarrow C \subseteq P$ | CP: $C \not\subseteq P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \subseteq NP$ | CP: $C \not\subseteq NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \subseteq coNP$ | CP: $C \not\subseteq coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \subseteq EXP$ | CP: $C \not\subseteq EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

Ex. : Meaning of Theorem for class NP

Let A be NP-complete set.

By the contraposition of Theorem (1) we have

$$NP \neq P \rightarrow A \notin P$$


That is, NP-complete sets are NP-sets that cannot be recognized in polynomial time unless $P = NP$.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

NP完全問題とは、クラスNPの中で最も難しい問題群を構成しているといえる。



例：クラスNPに関する定理の意味するところ

NP完全集合をAとする。

定理(1)の対偶より： $NP \neq P \rightarrow A \notin P$

つまり、NP完全集合は $P=NP$ でない限り、


多項式時間では認識できないNP集合である。

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

NP-complete problems form the most difficult problems in the class NP.



Ex. : Meaning of Theorem for class NP

Let A be NP-complete set.

By the contraposition of Theorem (1) we have

$$NP \neq P \rightarrow A \notin P$$

That is, NP-complete sets are NP-sets that cannot be recognized in polynomial time unless $P = NP$.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

定理 A : 任意の C 完全集合

任意の集合 B に対して以下が成立

(1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ は C 困難.

(2) $A \leq_m^P B$ かつ $B \in C \rightarrow B$ は C 完全.

証明:

定義より, $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$

定理より, $L \leq_m^P A \wedge A \leq_m^P B \rightarrow L \leq_m^P B$

よって, $\forall L \in C [L \leq_m^P B]$

つまり B は C 困難.

ひとたび NP 完全問題 A が得られたら,
これを使って他の問題の困難性を
「測定」できる.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Theorem 6.4. A: any C-complete set

For any set B we have

(1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ is C-hard.

(2) $A \leq_m^P B$ and $B \in C \rightarrow B$ is C-complete.

Proof:

By definition, $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$

By Theorem, $L \leq_m^P A \wedge A \leq_m^P B \rightarrow L \leq_m^P B$

Therefore, $\forall L \in C [L \leq_m^P B]$

That is, B is C-hard.

Once you have an NP-complete problem A, it can be used to measure to the other problems